

Правила госпитализации в ГБУЗ «СОКПТД»

1. Госпитализация в специализированный противотуберкулезный стационар осуществляется при наличии показаний.
2. Показания для госпитализации в специализированный противотуберкулезный стационар определяются врачом-фтизиатром.
3. Перечень обязательных методов обследования при госпитализации в специализированный противотуберкулезный стационар:
 - 3.1. При подозрении на заболевание туберкулезом органов дыхания проводятся:
 - обзорная рентгенография органов грудной клетки;
 - общий анализ крови;
 - общий анализ мочи;
 - исследование мокроты методами световой микроскопии на наличие кислотоустойчивых микроорганизмов с окраской по Цилю-Нильсену или микроскопии с окраской люминесцентными красителями;
 - при получении отрицательного результата микроскопического исследования мокроты проводится молекулярно-генетическое исследование на наличие маркеров ДНК МБТ.
 - диагностическая внутрикожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении;
 - лихорадящим больным ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией при отсутствии изменений на обзорной рентгенограмме грудной клетки в проводится мультиспиральная компьютерная томография легких и средостения;
 - консультация врача-фтизиатра.
 - 3.2. При подозрении на туберкулез внелегочной локализации проводятся:
 - лучевое (рентгенологическое, томографическое, ультразвуковое, магнитно-резонансное) или специальное, с учетом пораженного органа, инструментальное исследование;
 - общий анализ крови;
 - общий анализ мочи;
 - осмотр врачом-специалистом с учетом локализации предполагаемого очага туберкулеза;
 - исследование биологического материала (моча, ликвор, пунктат, гной, отделяемое свищей, выпот и др.) из предполагаемого очага туберкулеза на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии;
 - морфологические исследования биологического материала из предполагаемого очага туберкулеза: цитологические и гистологические;
 - консультация врача-фтизиатра;
4. При плановой госпитализации в детский специализированный стационар дополнительно необходимо предоставлять:
 - анализ кала на кишечную группу методом посева давностью не более 14 дней;
 - справку об отсутствии карантина в связи с инфекционными заболеваниями по месту учебы и проживания давностью не более 3 дней;
 - справку о профилактических прививках;
 - результаты флюорографического обследования взрослых в окружении ребенка.
5. Лица, находящиеся в стационаре с целью ухода за ребенком, должны при себе иметь:
 - анализ кала на кишечную группу методом посева давностью не более 14 дней;
 - анализ кала на яйца глистов давностью не более 14 дней;
 - результат перианального соскоба на энтеробиоз давностью не более 14 дней;

- справку об отсутствии карантина в связи с инфекционными заболеваниями по месту проживания давностью не более 3 дней;
- справку о профилактических прививках согласно Национальному календарю профилактических прививок.

6. Пациенту при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- детям до 15 лет свидетельство о рождении;
- детям до 17 лет включительно документ, удостоверяющий личность законного представителя.

Основание: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 г. № 50 (ред. от 29.12.2015 г.) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПин 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».